


14 DICIEMBRE 2020

Sesión Interhospitalaria Neumosur:

Soporte respiratorio no invasivo en tiempos de COVID-19 en Neumosur.






Soporte respiratorio no invasivo en IRA en tiempos de COVID-19 de Neumosur


Germán García de Vinuesa Calvo
Sección de Neumología
Hospital de Mérida



Índice




- ¿Es útil el SRNI en la IRA Hipoxémica (**IRAH_x**) 2^a neumonía por SARS-CoV-2?
- ¿Cómo elegir cada nivel de SRNI?
- ¿Cómo aplicar el SRNI?
 - Monitorización de eficacia y resultados
 - Seguridad
 - Medidas de control del riesgo de contagio



¿Es útil el SRNI en la
neumonía por SARS-CoV-2?

¿Por qué SRNI?



- Evolución del SRNI hasta 2019 (era “pre COVID-19”)
- ¿Qué aporta el SRNI respecto a la VMI en la era COVID-19?

Evolución del SRNI en IRAH era “pre-COVID”

JAMA | Original Investigation | CARING FOR THE CRITICALLY ILL PATIENT

Association of Noninvasive Oxygenation Strategies With All-Cause Mortality in Adults With Acute Hypoxemic Respiratory Failure
A Systematic Review and Meta-analysis

JAMA. 2020; 324(1):57-67.

- IOT
- Mortalidad



- **O2 vs VMNI:** VMNI es superior a O2 convencional (probable **mayor beneficio en pacientes más graves** $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$)
- **O2 vs OAF:** OAF no es claramente superior a O2 convencional en $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$, pero **no valorado en pacientes con $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \geq 200$**
- **O2 vs Helmet:** Helmet es superior a O2 convencional **independiente de gravedad** (> beneficio en casos + graves)
- **OAF vs VMNI:** VMNI no parece superior a OAF, pero no hay estudios por gravedad (parece superior en $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$)
- **OAF vs Helmet:** ¿? (no hay estudios)
- **VMNI vs Helmet:** Helmet es superior a VMNI (solo 1 estudio)



Evolución del SRNI en IRAH era “pre-COVID”

JAMA | Original Investigation | CARING FOR THE CRITICALLY ILL PATIENT

Association of Noninvasive Oxygenation Strategies With All-Cause Mortality in Adults With Acute Hypoxemic Respiratory Failure
A Systematic Review and Meta-analysis

JAMA. 2020; 324(1):57-67.

- IOT
- Mortalidad

- **O2 vs VMNI:** VMNI es superior a O2 convencional (probable mayor beneficio en pacientes más graves $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$)
- **O2 vs OAF:** OAF no es claramente superior a O2 convencional en $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$, pero no se valorado en pacientes con $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \geq 200$
- **O2 vs Helmet:** Helmet es superior a O2 convencional independiente de gravedad (> beneficio en casos + graves)
- **OAF vs VMNI:** VMNI no parece superior a OAF, pero **no hay estudios por gravedad** (parece superior en $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$)
- **OAF vs Helmet:** ¿? (no hay estudios)
- **VMNI vs Helmet:** Helmet es superior a VMNI (solo 1 estudio)



Evolución del SRNI en IRAH era “pre-COVID”

JAMA | Original Investigation | CARING FOR THE CRITICALLY ILL PATIENT

Association of Noninvasive Oxygenation Strategies With All-Cause Mortality in Adults With Acute Hypoxemic Respiratory Failure
A Systematic Review and Meta-analysis


JAMA. 2020; 324(1):57-67.

- IOT
- Mortalidad

- **O2 vs VMNI:** VMNI es superior a O2 convencional (probable mayor beneficio en pacientes más graves $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$)
- **O2 vs OAF:** HFNO no es claramente superior a O2 convencional en $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 200$, pero no se valorado en pacientes con $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \geq 200$
- **O2 vs Helmet:** Helmet es superior a O2 convencional independiente de gravedad (> beneficio en casos + graves)
- **OAF vs VMNI:** VMNI no parece superior a OAF, pero no hay estudios por gravedad (parece superior en $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$)
- **OAF vs Helmet:** ¿? (no hay estudios)
- **VMNI vs Helmet:** Helmet es superior a VMNI (solo 1 estudio)



Estrategia SRNI pre-COVID



Modificado de ilustración del Grupo Multidisciplinario
Español de Expertos en Terapias Respiratorias
No Invasivas

<https://www.internationalhighflownetwork.com>

¿Qué aporta el SRNI en COVID-19?

- **Situación epidemiológica especial:**
 - 5-10% de pacientes ingresados por COVID-19 tienen IRAH_x grave
 - Saturación de UCI: Largas estancias en situación de baja disponibilidad
 - Enfermedad nueva y desconocida
- **Forma de IRAH_x con características distintas a las conocidas:**
 - Alta mortalidad de pacientes con VMI (30-50%)
 - Tendencia al uso de VMNI con resultados favorables en estudios observacionales:
 - En países con alta disponibilidad de camas de UCI, hasta el 40% de los pacientes de UCI no tiene VMI
 - Uso creciente (40-50%) y resultados positivos con SRNI
 - Hipoxemia silente o “happy” disnea
 - Fenotipos o estadios evolutivos más favorables para respuesta a SRNI
- En nuestro entorno, el SRNI se puede aplicar al 70% de pacientes con IRAH 2º a COVID-19 y podría evitar un alto número de ingresos en UCI (hasta un 70%)

Guidance for the role and use of non-invasive respiratory support in adult patients with coronavirus (confirmed or suspected)

26 March 2020 Version 2

1. Summary

This document should be used to guide clinicians on the appropriate use of continuous positive airway pressure (CPAP), non-invasive ventilation (NIV, here referring to bilevel positive airway pressure, BiPAP) and high flow nasal oxygen (HFNO, such as Optiflow®) in patients with confirmed or suspected COVID-19. Published evidence, clinical guidelines and personal communications with colleagues in China and Italy have informed this document.

The guidance is not designed to be prescriptive but to provide a useful aid to use alongside clinical judgement. It can be adjusted to suit individual clinical environments. Decisions relating to the escalation of ventilatory support (whether as a trial of treatment, as a ceiling of care, or as a possible bridge to ongoing invasive ventilation) need to be made early and by experienced clinical decision-makers.

Key recommendations as of 26 March 2020

- We strongly advise early discussions seeking to ascertain ceilings of treatment at presentation in all patients. In acute inappropriate escalation of ventilatory support <https://www.rcts.org/updates/2020/05/>
- The use of HFNO is not advocated in COVID-19 patients, based on lack of efficacy, oxygen use and infection spread.
- NIV with BiPAP is usually not needed in those with otherwise normal lungs; compliance is usually maintained in COVID-19 patients. However, excessive use of

NHS England and NHS Improvement



GUIDELINES

Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

[illegible]

Background: The most visible acute high-dose symptoms (e.g., flu-like) associated with the use of a highly sensitive (e.g., Cerebrolysin[®]) have been reported in the elderly population.

Methods: Information on age, sex, and height of 28 subjects (12 countries, 14 panel members) comprised the first round. Organizations submitted an online decision form. The second panel consisted of 20 questions that all relevant to the management of COVID-19 in the EU. Most questions had two possible answers: correct and incorrect evidence on the management of COVID-19. The correct answer was usually the one that was supported by the scientific literature. The third round was a survey to explore the reasons for incorrect answers. We assessed the validity of the evidence using the Quality of Recommendations Analysis tool. Descriptions and Evaluation (DICE) approach: three pre-defined recommendations (based on the balance between benefit and harm, severity and cost) might denote safety, and feasibility. Recommendations were either incorrect, correct, or the level of decision recommendation.

Results: The Surviving Spans Campaign (SSC) 14-part course covered 54 statements, of which 4 are based on good evidence, 14 are strong recommendations, and 35 are weak recommendations. No recommendation was provided for 4 questions. The topics were: (1) infection control (20), (2) laboratory diagnosis and specimens (2), (3) epidemiology (1), (4) support (1), and (5) SSC 14 (14).

Full-text information is available at the end of the article.

ARCHIVOS DE
Bronconeumología

SEPMAB Survey

Recomendaciones de consenso respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente adulto con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2¹⁹⁻²⁰

César Cuenca Gómez*, Oscar Pedraza Rodríguez*, Mirella Jahn Turró*, Carlos Igna Santokalla*,
José Fernando Mora Jiménez*, Javier Carriá Fernández*, José Manuel Carratalá Picot*,
Sarah Watkins-Hughes*, Miguel Ferrer Moorad*, José M. de Andrés Nieto*, Eva Llista Arís*,
José Luis Sánchez Roscamara*, José Ignacio Carrozzini*, Miguel J. Zamorano Serrano*,
Wiblica González Martínez*, Eva Ferrero Muñoz*, Olga Mediano San Andrés*, Gertruda Rold Cervera*,
Anaïs Mas Serra*, Gonzalo-Hernández Martínez*, Candelaria de Haro López*, Oriol Boix Gas*,

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 257: 105–112

© 2006 International Journal of Health Services, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without prior written permission from the publisher. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$09.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organisations authorised by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from Cambridge or the American Branch of Cambridge University Press.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

00000000

[illegible]

¹ Los datos proceden de los censos de 2002 y 2007 y de la encuesta de hogares de 2007 y 2012. Los datos de 2002 y 2007 corresponden a la encuesta de hogares de 2002 y 2007, respectivamente.

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 389–397

- **NHS:**
 - No OAF / No VMNI
 - Solo CPAP como puente a VMI

- **Surviving Sepsis Campaign:**
 - OAF sobre O2 o VMNI
 - VMNI como puente a VMI


- **SEPAR, SEDAR, SEMICYUC:**
 - OAF como 1ª elección sobre VMNI
 - VMNI 2ª elección, en caso de respuesta insuficiente y sin criterios inmediatos de VMI

¿Qué aporta el SRNI en COVID-19?

- **Situación epidemiológica especial:**
 - 5-10% de pacientes ingresados por COVID-19 tienen IRAH_x grave
 - Saturación de UCI: Largas estancias en situación de baja disponibilidad
 - Enfermedad nueva y desconocida
- **Forma de IRAH_x con características distintas a las conocidas:**
 - Alta mortalidad de pacientes con VMI (30-50%)
 - Tendencia al uso de VMNI con resultados favorables en estudios observacionales:
 - En países con alta disponibilidad de camas de UCI, hasta el 40% de los pacientes de UCI no tiene VMI
 - Uso creciente (40-50%) y resultados positivos con SRNI
 - Hipoxemia silente o “happy” disnea
 - Fenotipos o estadios evolutivos más favorables para respuesta a SRNI
- En nuestro entorno, el SRNI se puede aplicar al 70% de pacientes con IRAH 2º a COVID-19 y podría evitar un alto número de ingresos en UCI (hasta un 70%)

Clinical course and outcomes of critically ill patients with COVID-19 infection: a systematic review

Rodrigo B. Serafim^{1, 2, 3, *}, Pedro Póvoa^{4, 5, 6}, Vicente Souza-Dantas¹, André C. Kalil^{6, 7}, Jorge I.F. Salluh¹



Clin Microbiol Infect. 2020; S1198-743X(20)30648-0

- Búsqueda hasta 20/Agosto/2020
- 32 artículos **n** = 69093 **Edad media** = 56 años
 - **EPIMED** (Brasil) **n** = 41858 **Edad media** = 61 años
 - **ICNARC** (UK) **n** = 10547 **Edad media** = 60 años
 - **ISARIC** (25 países) **n** = 9754 **Edad media** = 72 años
 - Resto de estudios, en su mayoría en China (pero solo 1,3% del total de pacientes)
- **VMNI** → 25,5% **OAF** → 20,5%
- **Tiempo VMNI** → 2,4 días **Tiempo VMI** → 14,6 días
- **Mortalidad global** → 32,3% / **Mortalidad pacientes VMI** → **58%**

¿Qué aporta el SRNI en COVID-19?

- **Situación epidemiológica especial:**
 - 5-10% de pacientes ingresados por COVID-19 tienen IRAH_x grave
 - Saturación de UCI: Largas estancias en situación de baja disponibilidad
 - Enfermedad nueva y desconocida
- **Forma de IRAH_x con características distintas a las conocidas:**
 - Alta mortalidad de pacientes con VMI (30-50%)
 - Tendencia al uso de VMNI con resultados favorables en estudios observacionales:
 - En países con alta disponibilidad de camas de UCI, hasta el 40% de los pacientes de UCI no tiene VMI
 - Uso creciente (40-50%) y resultados positivos con SRNI
 - Hipoxemia silente o “happy” disnea
 - Fenotipos o estadios evolutivos más favorables para respuesta a SRNI
- En nuestro entorno, el SRNI se puede aplicar al 70% de pacientes con IRAH 2º a COVID-19 y podría evitar un alto número de ingresos en UCI (hasta un 70%)

Case characteristics, resource use, and outcomes of 10 021 patients with COVID-19 admitted to 920 German hospitals: an observational study


Christian Karagiannidis*, Carina Mostert*, Corinna Hentschker, Thomas Voshaar, Jürgen Malzahn, Gerhard Schillinger, Jürgen Klauber, Uwe Janssens, Gernot Marx, Steffen Weber-Carstens, Stefan Kluge, Michael Pfeifer, Linus Grabenhenrich, Tobias Welte, Reinhard Busse

	All patients	Patients without ventilation	Patients with ventilation 17,3%				
		82,7%	All types of ventilation	Non-invasive ventilation only	Invasive ventilation only	Non-invasive ventilation failure	Ventilation for >1 h
Number of patients	10 021	8294	1727	145	1318	141	65
Number of hospitals	920	894	563	107	492	93	59
Age, years							
Mean (SD)	68.3 (17.3)	68.3 (18.0)	68.4 (13.1)	72.4 (12.2)	67.9 (13.1)	67.6 (12.9)	74.0 (14.1)
Median (IQR)	72.0 (57.0-82.0)	73.0 (56.0-83.0)	71.0 (60.0-79.0)	75.0 (64.0-82.0)	70.0 (59.0-78.0)	70.0 (59.0-78.0)	77.0 (67.0-84.0)
Age group, years							
18-59	2896 (28.9%)	2474 (29.8%)	422 (24.4%)	22 (15.2%)	337 (25.6%)	37 (26.2%)	9 (13.8%)
60-69	1621 (16.2%)	1239 (14.9%)	382 (22.1%)	23 (15.9%)	305 (23.1%)	32 (22.7%)	9 (13.8%)
70-79	2158 (21.5%)	1623 (19.6%)	535 (31.0%)	45 (31.0%)	413 (31.3%)	45 (31.9%)	20 (30.8%)
≥80	3346 (33.4%)	2958 (35.7%)	388 (22.5%)	55 (37.9%)	263 (20.0%)	27 (19.1%)	27 (41.5%)
Length of hospital stay, days							
Mean (SD)	14.3 (13.8)	12.0 (11.3)	25.2 (18.5)	18.1 (13.3)	26.5 (18.7)	29.9 (19.7)	11.9 (14.3)
Median (IQR)	10.0 (5.0-19.0)	9.0 (5.0-15.0)	21.0 (10.0-37.0)	15.0 (8.0-25.0)	23.0 (11.0-39.0)	26.0 (14.0-44.0)	6.0 (1.0-14.0)
Ventilation, days							
Mean (SD)	13.5 (12.1)	..	13.5 (12.1)	3.6 (4.2)	15.1 (12.1)	17.1 (12.7)	0.1 (0.1)
Median (IQR)	10.1 (4.3-19.3)	..	10.1 (4.3-19.3)	2.2 (0.9-4.3)	11.8 (5.9-21.5)	13.0 (8.0-24.0)	0.1 (0.1-0.2)
Tracheostomy	445 (4.4%)	..	445 (25.8%)	..	406 (30.8%)	39 (27.7%)	..
Extracorporeal membrane oxygenation	119 (1.2%)	..	119 (6.9%)	..	104 (7.9%)	12 (8.5%)	..
Dialysis	599 (6.0%)	130 (1.6%)	469 (27.2%)	7 (4.8%)	404 (30.7%)	41 (29.1%)	..
Deaths	2229 (22.2%)	1323 (16.0%)	906 (52.5%)	65 (44.8%)	696 (52.8%)	70 (49.6%)	42 (64.6%)



Data are n (%), unless otherwise indicated. Data are not shown in cells that contain fewer than five patients. BMI=body-mass index.

Table 1: Patient characteristics by type of ventilation

16,5% NIV
(no incluye HFNC ni CPAP)



Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
Daily Situation Report of the Robert Koch Institute
07/12/2020 - UPDATED STATUS FOR GERMANY




Registro DIVI (desde 16/4/2020); datos actualizados a 13/12/2020:

- 81% (n=21.786) ocupación UCI general
- 16,8% (n=4.552) ocupación UCI por COVID

Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)

Daily Situation Report of the Robert Koch Institute


07/12/2020 - UPDATED STATUS FOR GERMANY



¿Qué aporta el SRNI en COVID-19?


- **Situación epidemiológica especial:**
 - 5-10% de pacientes ingresados por COVID-19 tienen IRAH_x grave
 - Saturación de UCI: Largas estancias en situación de baja disponibilidad
 - Enfermedad nueva y desconocida
- **Forma de IRAH_x con características distintas a las conocidas:**
 - Alta mortalidad de pacientes con VMI (30-50%)
 - Tendencia al uso de VMNI con resultados favorables en estudios observacionales:
 - En países con alta disponibilidad de camas de UCI, hasta el 40% de los pacientes de UCI no tiene VMI
 - Uso creciente (40-50%) y resultados positivos con SRNI
 - Hipoxemia silente o “happy” disnea
 - Fenotipos o estadios evolutivos más favorables para respuesta a SRNI
- En nuestro entorno, el SRNI se puede aplicar al 70% de pacientes con IRAH 2ª a COVID-19 y podría evitar un alto número de ingresos en UCI (hasta un 70%)

Hipoxemia silente o “happy” disnea y fenotipos




Mecanismos de **hipoxemia**:

1. Trombosis y microtrombosis
2. Alteración respuesta vascular
3. **Inflamación**
4. **Disrupción barrera alveolo-capilar**




50%

Phenotype 1:
multiple, focal, possibly
overperfused ground glass
opacities




Phenotype 2:
inhomogeneously distributed
atelectasis and peribronchial
opacities



20-30%

Phenotype 3:
patchy ARDS-like pattern



Fenotipo “L”

Clínica:

- Respiración normal, hipoxemia silente
- Hipocapnia marcada

Mecánica pulmonar:

- COMPLIANCE casi normal ($Crs > 50$)
- Alteración V/Q
- Bajo peso pulmonar por TC
- Baja recrutabilidad

Fenotipo intermedio “H-L”

COMPLIANCE

($40 > Crs < 50$)

Fenotipo “H”

Clínica:


- Disnea y esfuerzo respiratorio marcados
- Normo o hipercápnico

Mecánica pulmonar:


- COMPLIANCE baja ($Crs < 40$)
- Shunt derecha-izquierda
- Alto peso pulmonar por TC ($> 1,5$ kg)
- Alta recrutabilidad

50%

Phenotype 1:
multiple, focal, possibly
overperfused ground glass
opacities




Phenotype 2:
inhomogeneously distributed
atelectasis and peribronchial
opacities



20-30%

Phenotype 3:
patchy ARDS-like pattern



Fenotipo “L”

Ventilación:

- Volúmenes altos
- PEEP no muy alta
- FR $\approx$ a la de paciente, lo + baja posible

Fenotipo intermedio

Ventilación:


- Volúmenes convencional
- PEEP intermedia

Fenotipo “H”

Ventilación protectora:

- Volúmenes bajos
- PEEP alta
- FR alta


Phenotype 1:
multiple, focal, possibly
overperfused ground glass
opacities



Phenotype 2:
inhomogeneously distributed
atelectasis and peribronchial
opacities




Phenotype 3:
patchy ARDS-like pattern




Fenotipo “L”

Fenotipo “H-L”

Fenotipo “H”







Fenotipo “L”

Fenotipo “H-L”


Fenotipo “H”




Phenotype 1:
multiple, focal, possibly
overperfused ground glass
opacities



Phenotype 2:
inhomogeneously distributed
atelectasis and peribronchial
opacities




Phenotype 3:
patchy ARDS-like pattern



Fenotipo “L”


Fenotipo “H-L”

Fenotipo “H”




¿Qué aporta el SRNI en COVID-19?

- **Situación epidemiológica especial:**
 - 5-10% de pacientes ingresados por COVID-19 tienen IRAH_x grave
 - Saturación de UCI: Largas estancias en situación de baja disponibilidad
 - Enfermedad nueva y desconocida
- **Forma de IRAH con características distintas a las conocidas:**
 - Alta mortalidad de pacientes con VMI (30-50%)
 - Tendencia al uso de VMNI con resultados favorables en estudios observacionales:
 - En países con alta disponibilidad de camas de UCI, hasta el 40% de los pacientes de UCI no tiene VMI
 - Uso creciente (40-50%) y resultados positivos con SRNI
 - Hipoxemia silente o “happy” disnea
 - Fenotipos o estadios evolutivos más favorables para respuesta a SRNI
- En nuestro entorno, se **estima que el SRNI se puede aplicar al 70% de pacientes con IRAH_x 2ª a COVID-19** y podría **evitar un alto número de ingresos en UCI** (hasta un 70%)



¿Cómo elegir cada nivel de SRNI?





Aspectos claves

Hipoxemia
silente
ó
“Happy disnea”

Distintos escenarios en función de la Gravedad inicial-evolutiva de la IRAH_x:

- **Alteración del intercambio gaseoso:**
 - GAB y GA con O₂ evolutivas → IMPRESCINDIBLE ... ¿o no?
 - PaO₂/FiO₂
 - SatO₂/FiO₂ (ecuación Severinhausse-Ellis)
<https://www.rccc.eu/protocolos/SpFi.html>
- **Patrón respiratorio**
 - FR





Distintos inicial-ev

- Altera

- GAB
- no?
- PaO₂
- SatO₂

- Patrón

- FR

SpFi y PaFi

Cálculo de PaO₂/FiO₂ según SpO₂ (pulsioximetría) y su correlación con grado de SDRA y SOFA.

SpO₂ 93 %

FiO₂ 30 %

Calcular **Borrar**

SpFi= 310 mmHg
SDRA leve Mortalidad 27%
<u>PuntuaciónSOFA</u> 2
Equivalencia PaFi → 223 mmHg (ecuación de Severinhouse-Ellis)

Hipoxemia
silente
ó
"happy disnea"



BLE ... ¿o



[i.html](#)





Managing the Respiratory care of patients with COVID-19



- SatO₂
- FR


Managing the Respiratory care of patients with COVID-19




- SatO₂
- FR

Fenotipo según:

- Patrón Rx/TC
- Compliance





URGENCIAS
O2 a ≤ 3 L/min
Objetivo SatO2 $\geq 93\%$ y FR $\leq 20^1$

Reevaluar

¿Objetivo conseguido?

Si

Ingreso **MI²**

Reevaluar

Si empeoramiento

No

O2 a > 3 L/min por gafas o reservorio
Objetivo: SatO2 $\geq 93\%$ y FR $\leq 25^1$



Ingreso **Neumología**

Reevaluar

Si

Reevaluar

¿Empeoramiento?

¿Objetivo conseguido?

No

PaO₂/FiO₂ 150-250
Patrón L: No consolidación extensa

PaO₂/FiO₂ < 150
Patrón L/H: No consolidación extensa
o Compliance $> 40-50$ ml/cm H₂O

PaO₂/FiO₂ < 150
Patrón H: Consolidación extensa
o Compliance < 40 ml/cm H₂O

PaO₂/FiO₂ 150-250
Patrón L: No consolidación extensa



PaO₂/FiO₂ < 150
Patrón L/H: No consolidación extensa
o Compliance > 40-50 ml/cm H₂O

PaO₂/FiO₂ < 150
Patrón H: Consolidación extensa
o Compliance < 40 ml/cm H₂O



VMNI ± Sedación no profunda
Ajuste: IPAP 18-30 cm H₂O + EPAP 5-15 cm H₂O +
FR ≈ 18 rpm + FiO₂ 60-100%
Objetivo: SatO₂ ≥ 93% y FR ≤ 25
Alternativa: CPAP 10-15 cm H₂O + FiO₂ 60-100%

OAF
Ajuste: Flujo 40-90 lpm + FiO₂ 60-100%
Objetivo: SatO₂ ≥ 93% y FR ≤ 25

VMNI ± Sedación no profunda
Ajuste: IPAP para Vol 5-6 ml/kg + EPAP 10-15 cm
H₂O + FR ≈ 20 rpm + FiO₂ 60-100%
Objetivo: SatO₂ ≥ 93% y FR ≤ 25

Reevaluar

¿Objetivo conseguido?

Reevaluar

Si

No

¿ VMI ?

No


Si

Continuar soporte


Buena tolerancia → ↑sedación
+ Soporte sin cambios

Mala tolerancia → ↑sedación +
CPAP o HFNO o reservorio

Ingreso en **UCI** :
VMNI / VMI



¿Cómo aplicar el SRNI?



Aspectos a tener en cuenta...

- **Monitorización respuesta a SRNI:**

- GA con O₂ evolutivas → PaO₂/FiO₂
- SatO₂/FiO₂ (ecuación Severinhausse-Ellis)



<https://www.rccc.eu/protocolos/SpFi.html>

- **SatO₂ y FR**
- **Indice ROX** → (SatO₂/FiO₂) / FR




<https://www.rccc.eu/Respi/ROX.html>

Hipoxemia silenciosa
ó
“Happy disnea”

- **Seguridad**

- Monitorización multiparamétrica y Videovigilancia
- Mascarilla paciente
- Montajes SRNI con filtros adecuados
- EPI personal sanitario
- Presión negativa ¿?





Aspe

- **Monitorización**

- GA con O₂
- SatO₂/FiO₂
- SatO₂ y FR
- Índice ROX

- **Seguridad**

- Monitorización
- Mascarilla
- Montajes S
- EPI personal
- Presión neg

Browser: rccc.eu

Predicting success of high-flow nasal ca... ROX index

ROX index

Predicción de fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo por canula nasal

SpO2: 92 %

FiO2: 70 %

Fr: 27 rpm

Calcular **Borrar**

ROX= 4.85
fracaso de OAF
[ver interpretación](#)

SpFi= 131
Equivalencia PaFi=91

SpO₂ Saturación periférica de O₂ (pulsioximetría)

ente
ea”



Respuesta a OAF: índice Rox

- En general, en SDRA, predictor de fracaso si:

- **ROX** <3 a los 60 min
- **ROX** <3,5 a las 6 horas
- **ROX** <4 a las 12 horas

Roca AJRCCM 2019; 199 (11):1368-1376


- En neumonía, predictor de

- **ROX** > 4,88 a las 12 horas

- En neumonía por SARS-CoV-2

- **ROX** < 4,88 a los 30 minutos

- **FR** ≥ 26/min a los 30 minutos



Respuesta a OAF: índice Rox

Blez. Intensive Care Med. 2020 Nov; 46 (11): 2094-2095.

ROX Index

Predicción de fracaso de la oxigenoterapia de alto flujo por cánula nasal

SpO2: 92 %

FIO2: 70 %

FR: 27 rpm


Calcular Borrar

ROX= 4.85
fracaso de OAF
ver interpretación

SpFi= 131
Equivalencia PaFi=91

SpO2 Saturación periférica de O₂ (pulsioximetría)

- En general,
- ROX < 3 a
- ROX < 3,5
- ROX < 4 a



- En neumonía, predictor de éxito si:
 - ROX > 4,88 a las 12 horas AUC 0.78 S 81% E 38%
- En **neumonía por SARS-CoV-2**, predictor de fracaso si:
 - ROX < 4,88 a los 30 min → AUC 0.78
 - FR ≥ 26/min a los 30 min → AUC 0.81



Monitorización, Estructuras y Seguridad



- **Disponer de unidades (UCRI, UMIR) o plantas de hospitalización específicas** con dotación técnica y material adecuada:
 - Capacidad de monitorización multiparámetrica flexible/ampliable
 - Vigilancia directa o video-vigilancia (crisis comiciales, mascarilla sin válvulas anti-asfixia ...)
 - Fuentes de alta presión de O_2 y aire
 - Mezcladores aire / O_2
 - Caudalímetros de 30 L/min y 50-70 L/min
 - Humidificadores activos
- **Disponibilidad de personal capacitado:**
 - Enfermería / Fisioterapia
 - Neumología de guardia 24 horas






Monitorización, Estructuras y Seguridad



- **Disponer de unidades (UCRI, UMIR) o plantas de hospitalización específicas** con dotación técnica y material adecuada:
 - Capacidad de monitorización multiparámetrica flexible/ampliable
 - Vigilancia directa o video-vigilancia (crisis comiciales, mascarilla sin válvulas anti-asfixia ...)
 - Fuentes de alta presión de O_2 y aire
 - Mezcladores aire / O_2
 - Caudalímetros de 30 L/min y 50-70 L/min
 - Humidificadores activos
- **Disponibilidad de personal capacitado:**
 - Enfermería / Fisioterapia
 - Neumología de guardia 24 horas





Seguridad

- **Mascarilla paciente:**

- Reduce claramente emisión de aerosol y riesgo de contagio
- Aumento FiO_2 entregada *Montiel. Ann Intensive Care (2020) 10:125*

- Minimizar desconexiones

- Ajustar interfase para reducir fugas

- Usar Filtros:

- Doble rama → en entrada y salida del respirador
- Rama simple → entre interfase y circuito del respirador / válvula de CPAP

Seguridad

- **Mascarilla paciente:**




Figure 1 - Velocity map of gas flow for all tested settings. HVNI = high-velocity nasal insufflation.


Rama Simple > entre interfase y circuito del respirador /
válvula de CPAP

Leonard. Chest. 2020 Sep;158(3):1046-1049.



Seguridad

- Mascarilla paciente:
 - Reduce claramente emisión de aerosol y riesgo de contagio
 - Aumento FiO_2 entregada
- **Minimizar desconexiones**
- **Ajustar interfase para reducir fugas**
- Usar Filtros:
 - Doble rama → en entrada y salida del respirador
 - Rama simple → entre interfase y circuito del respirador / válvula de CPAP



Seguridad

- Mascarilla paciente:
 - Reduce claramente emisión de aerosol y riesgo de contagio
 - Aumento FiO_2 entregada
- Minimizar desconexiones
- Ajustar interfase para reducir fugas
- **Montajes SRNI con filtros adecuados:**
 - Doble rama → en entrada y salida del respirador
 - Rama simple → entre interfase y circuito del respirador / válvula de CPAP



Montaje SRNI con filtros adecuados



**FILTROS ANTIBACTERIANOS-
ANTIVÍRICOS DE BAJA RESISTENCIA**



Montaje SRNI con filtros adecuados



NUNCA INTERCAMBIADORES
DE CALOR-HUMEDAD SIN
FILTRO

Detalles técnicos

- **Aerosolterapia:**

- Reducir PS en VMNI
- Reducir T^a a 31°C en caso de OAF

- **Rotación de interfases:**

- De elección, Preferible Total Face o Helmet
- Apagar respirador y caudalímetros en cada rotación

- **Rotación de terapias:**

- Descansos de VMNI → OAF ± Reservorio
- OAF diurna / VMNI nocturna
- Dispositivo único y fungibles comunes para OAF, CPAP y VMNI

<https://www.internationalhighflownetwork.com/>

Detalles técnicos

- **Aerosolterapia:**
 - Reducir PS en VMNI
 - Reducir T^a a 31°C en caso de OAF




Detalles técnicos

- **Aerosolterapia:**

- Reducir PS en VMNI
- Reducir T^a a 31°C en caso de OAF

- **Rotación de interfases:**

- De elección, Preferible Total Face o Helmet
- Apagar respirador y caudalímetros en cada rotación




Detalles técnicos

- **Aerosolterapia:**
 - Reducir PS en VMNI
 - Reducir T^a a 31°C en caso de OAF
- **Rotación de interfases:**
 - De elección, Preferible Total Face o Helmet
 - Apagar respirador y caudalímetros en cada rotación
- **Rotación de terapias:**
 - Descansos de VMNI → OAF ± Reservorio
 - OAF diurna / VMNI o CPAP nocturna
 - Dispositivo único y fungibles comunes para OAF, CPAP y VMNI



Detalles técnicos



VMNI/
CPAP


OAF




- **Rotación de terapias:**

- Descansos de VMNI → OAF ± Reservorio
- OAF diurna / VMNI nocturna
- Dispositivo único y fungibles comunes para OAF, CPAP y VMNI






- ① El SRNI ha progresado en la era pre-COVID-19 y demostrado ser útil en **↓ IOT y mortalidad** en IRAH_x .
- ② La experiencia durante la pandemia y la opinión de expertos avalan el **uso de SRNI en IRAH_x 2ª a COVID-19**, pendiente de estudios que lo confirmen.
- ③ Es fundamental **estratificar la severidad** de la IRAH_x para optimizar la elección del tipo de SRNI y la aplicación del mismo.



- ④ Dada la gravedad de la patología, la **monitorización estrecha de la eficacia y respuesta** de la SRNI es indispensable.
- ⑤ Esta monitorización, junto con la **rápida tecnificación y alta capacitación en terapias respiratorias no invasivas, sedación y cuidados de semicríticos**, hacen que sea **crucial** la **implementación de UCRI/UMIR** para un adecuado manejo de los pacientes con **neumonía con IRAH_x grave 2ª a COVID-19**.



Neumomadrid @NeumoMadrid · 4 sept.

¿Sabías que las **#UCRI** requieren menos recursos que las UCI y su presencia reduce la mortalidad en las salas de hospitalización?

#NingúnHospitalSinUCRI neumomadrid.org/ningun-hospita...



↺↻ 11

♡ 23



Gracias a ...



Grupo de Trabajo de VMNI


VII Curso teórico-práctico de Ventilación Mecánica no Invasiva. VMNI 2019
03/04/2019

VII CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA



ANEME
Asociación de Neumólogos de Mérida

AstraZeneca 



Muchas gracias




PREGUNTAS

①

②

③



- **Situación UCI en Andalucía:**

- 59% de camas estructurales ocupadas (98% en Almería y 102% en Granada)
- Prevalencia IOT alta (81-82%)
- Días de ingreso en UCI en ascenso (18 días)

- Situación Neumología e

- UCRI:

- VIRGEN DE LAS NIEVES
- VIRGEN MACARENA →
- HOSPITAL REGIONAL D




SEGUIMIENTO DE INGRESOS EN UCI DE PACIENTES CON COVID-19

SAMIUC (Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias)

INFORME 5-12-2020





HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

El Hospital Ciudadanía Asistencia sanitaria Investigación Formación Profesionales

Asistencia sanitaria Neumología Cartera de servicios

El Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves atiende los procesos y procedimientos que componen la cartera de servicios de un hospital de primer Nivel en las siguientes Unidades:

1. UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI)
Hospital de día médico neumológico

2. UNIDAD DE CONSULTAS
Consultas de Neumología general

HUM Nuestro Hospital Profesionales Docencia Atención Ciudadana

NOTICIAS DEL HOSPITAL

Usted está en: Hospital Universitario Virgen Macarena • El Hospital Virgen Macarena inicia la reorganización de las áreas de hospitalización

[Volver al listado de noticias](#)

El Hospital Virgen Macarena inicia la reorganización de las áreas de hospitalización

Publicada el: sábado, 9 mayo 2020 | Escrito por Reyes Suárez

Al mismo tiempo el Hospital Macarena amplió la Unidad de Cuidados Intensivos con ocho boxes individuales (además de los 30 ya existentes), así como en la Unidad de Recuperación post-operatoria (URP), Unidad Coronaria y otras Áreas, hasta sumar un total de 70 camas.

En esta línea de actuaciones, se creó la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) con 6 camas para pacientes que requieran una vigilancia específica para patologías respiratorias complejas en pacientes positivos al COVID-19.

Hospital Regional Universitario de Málaga

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

INICIO EL HOSPITAL INFOR. CORPORATIVA ATENCIÓN CIUDADANA PROFESIONALES COMUNICACIÓN

Estas aquí > Comunicación > Sala de Prensa

[Listado de Artículos](#) [Archivo](#) [Buscar](#)

28 OCT El Hospital Regional de Málaga pone en marcha una unidad para mejorar la atención a pacientes con insuficiencia respiratoria severa
Publicado el 28-10-2020

La UCRI, a cargo de Neumología, cuenta con camas de hospitalización y aislamiento vigilado


• Situación Neumología en Andalucía:

• UCRI:

- VIRGEN DE LAS NIEVES
- VIRGEN MACARENA
- HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA

• UMIR:

- VIRGEN DEL ROCIO



Archivos de Bronconeumología
Available online 10 December 2020
In Press, Corrected Proof

SEPAR habla

Sumario de recomendaciones y puntos clave del Consenso de las Sociedades Científicas Españolas (SEPAR, SEMICYUC, SEMES; SECIP, SENEo, SEDAR, SENP) para la utilización de la ventilación no invasiva y terapia de alto flujo con cánulas nasales en el paciente adulto, pediátrico y neonatal con insuficiencia respiratoria aguda grave

Manel Luján^{a, R, B}, Óscar Peñuelas^B, César Cinesi Gómez^C, Alberto García-Salido^A, Julio Moreno Hernando^A, Antonio Romero Berrocal^F, Iñaki Gutiérrez Ibarluzea^B, Juan Fernando Masa Jiménez^B, Arantxa Mas^I, José Manuel Carratalá Perales^J, Mirella Gaboli^K, Ana Concheiro Guisán^L, Javier García Fernández^M, Joaquín Escámez^N, Julio Parrilla Parrilla^O, Eva Farrero Muñoz^P, Mónica González^Q, Sarah Béatrice Heilli-Frades^T, ... Carlos Egea Santaolalla^R

Show more ▾

+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.08.013> [Get rights and content](#)

Recommended articles
No articles found.

Citing articles (0)

Article Metrics

Social Media

Tweets: 16

WPLUMX [View details >](#)



- Guía de recomendaciones de buena práctica clínica para la aplicación de SRNI en pacientes con IRA grave
- Avaladas por todas las sociedades científicas involucradas en el manejo del paciente adulto y pediátrico/neonatal.
- Revisión de la literatura + Actualización de la evidencia disponible (3 categorías; indicaciones, monitorización y seguimiento)
- **Recomendaciones de actuaciones clínica basadas en:**
 - Consenso de profesionales donde existiera evidencia de suficiente calidad y una concordancia profesional alta.
 - Consenso tácito y recogido como tal donde los datos no estaban disponibles

PREGUNTAS

①

②

③