



PUBLICIDAD

Contrate publicidad en JANO.es

JANO.es
MEDICINA Y HUMANIDADES

"Ciertos libros parecen haber sido escritos
no para aprender de ellos, sino para que se
reconozca lo que sabía su autor"

Goethe



* NEWSLETTER »

* MI CUENTA ELSEVIER »

PORTADA ACTUALIDAD OPINIÓN MEDICINA HUMANIDADES MÉDICAS OCIO Y CULTURA BLOGS PREMIOS GALIEN

Buscar



Jueves, 30 de agosto de 2012
Actualizado a las 12:26h

Últimas Noticias

NEUMOLOGÍA

★ Guardar en Mis Documentos

Los síntomas psicológicos influyen más que las variables espirométricas en los pacientes con fibrosis quística

JANO.es · 29 Agosto 2012 13:53

Vota ☆☆☆☆☆ Resultado ★★★★★ 0 votos

Comentarios - 0

Un estudio de Neumosur halla una alta prevalencia de depresión y ansiedad entre los afectados por la enfermedad, con índices del 21,5% y del 31%, respectivamente.

Los síntomas psicológicos influyen más que las variables espirométricas en la calidad de vida de los pacientes con fibrosis quística, según ha evidenciado un estudio realizado por la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur), y en la que han participado especialistas del Hospital Costa del Sol de Marbella y del Hospital Carlos Haya de Málaga.

Los investigadores han hallado una alta prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos en estos pacientes, con índices del 21,5% y del 31%, respectivamente. Estudios anteriores ya habían mostrado que entre un 29 y un 46% de estos enfermos sufren depresión, frente a entre un 5 y un 17% de personas que no padecen fibrosis quística.

Por otra parte, y en relación con los niños y adolescentes en edad escolar con fibrosis quística, los pocos estudios realizados muestran un índice de depresión que oscila entre el 11 y el 14,5%, porcentajes que se reducen al 2-6% en los menores libres de la enfermedad.

La investigación llevada a cabo por Neumosur ha evidenciado que los síntomas psicológicos "condicionan una peor calidad de vida independientemente de la afectación pulmonar". Por ello, los enfermos con patología pulmonar moderada o grave y puntuaciones altas en depresión "mostraron resultados significativamente peores" que aquellos con enfermedad pulmonar grave pero sin síntomas depresivos, señalan los expertos.

Ante esto, recomiendan la realización de un cribado rutinario y estandarizado anual para depresión y ansiedad. De hecho, lo aconsejan "tanto para los pacientes de fibrosis quística como para sus cuidadores".

★ Guardar en Mis Documentos

✉ Enviar a un amigo

Webs Relacionadas

Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur

Noticias relacionadas

28 Ago 2012 · Actualidad

SEFAC reclama más excepciones en la lista de medicamentos desfinanciados por Sanidad

Considera que algunos de los fármacos excluidos de la gratuidad sirven para tratar dolencias que no pueden considerarse leves, como la EPOC o la fibrosis quística.

02 Mar 2012 · Actualidad

Diseñan un dispositivo que reduce en un 40% el tiempo de nebulización en pacientes de fibrosis quística

El I-neb introduce un modo de inhalación por objetivos, lo que en la práctica supone un entrenamiento continuo para el paciente en cada inhalación.

27 Feb 2012 · Actualidad

JANO LA REVISTA

La información médica más relevante.

¡Suscríbese!

Para no perderse



ENTRE LÍNEAS
Cuando la presión laboral desemboca en el suicidio



ENTRE LÍNEAS
Un nuevo volumen de medicina de los seguros



ENTRE LÍNEAS
Electroencefalografías a partir de casos clínicos



ENTRE LÍNEAS
La plataforma forunclicin inaugura un apartado sobre sida

Publicidad

OFERTAS INCREÍBLES EN VUELOS

de **JEREZ**
a **LONDRES**

¡Reserva Hoy!

eDreams
viajamos contigo

Últimas noticias

Lo más leído

El paciente con angina de pecho es más pesimista que el médico respecto al pronóstico de la enfermedad

CARDIOLOGÍA

Desarrollan un análisis de sangre que muestra los daños en el hígado del consumo de alcohol

HEPATOLOGÍA

Científicos del CNIO crean un modelo de ratón para estudiar la anemia aplásica

INVESTIGACIÓN

Los residentes de México con las mejores notas de

21 Feb 2012 11:00 Actualidad

Aumenta la supervivencia de los pacientes con enfermedades respiratorias minoritarias

Los pacientes de fibrosis quística, por ejemplo, han pasado de 27 a 38 años de promedio.

Comentarios - 0

Su comentario:

Datos personales:

Nombre*: Correo Electrónico*:

Página web/blog - Si desea mostrarla:

Normas de uso:

JANO.es, portal informativo dirigido a los profesionales de la salud, se reserva el derecho a publicar los comentarios que considere oportunos, tras ser revisados por su Redacción.

JANO.es no se compromete a responder a los comentarios recibidos ni a proporcionar más información de la que se facilita en los propios artículos y enlaces de internet relacionados.

☐ Acepto la [cláusula de privacidad](#)

Enviar comentario

Los accidentes de tráfico son los causantes de cerca del 20% de las lesiones medulares en España

LESIONADOS MEDULARES

Mato asegura que ningún extranjero quedará desatendido, pero quien no tenga la tarjeta sanitaria tendrá que pagar

POLÍTICA SANITARIA

RECURSOS SANITARIOS

PRODUCTOS ELSEVIER

LIBROS DE MEDICINA

REVISTAS DE MEDICINA

FORMACIÓN

blogs Jano.es

» [ver todos los blogs](#)



Ciril Rozman

El blog de Ciril Rozman

Toda la información de la máxima actualidad sobre la docencia en España, tendencias de futuro, etc.



Óscar Giménez

Si Galileo levantara la cabeza

Pensar con la vejiga llena

Estudios premiados con el IgNobel analizan el efecto de la urgencia de orinar sobre la función cognitiva.

2 comentarios



Gonzalo Casino

Escepticismo

Infoescepticismo

Sobre la necesidad de fomentar la lectura crítica de la información médica

15 comentarios



Ramón Sánchez Ocaña

Disecciones

Nos pesa el futuro

13 comentarios

Últimos comentarios

En un abrir y cerrar de ojos

Si Galileo levantara la cabeza

Bueno, para ese caso que traigan a especialistas de otros países que haya...

Inyecciones sin dolor

Salud digital

Buenos días, me parecen interesantes los artículos publicados en esta sección...

Blogosfera médica

Escepticismo

Hola, Gonzalo Casino, yo he visto su Blog y me agrada lo que escribe, en ...

Pensar con la vejiga llena

Si Galileo levantara la cabeza

Si tuvieras una cistitis intersticial no pensarías lo mismo

Bob Esponja, demasiado absorbente

Si Galileo levantara la cabeza

Excelente artículo, aunque no creo que a Nickelodeon le haya gustado los ...

Pensar con la vejiga llena

Si Galileo levantara la cabeza

bueno hay temas mas importantes

agenda médica

» [ver agenda](#)

Máster "Enfermo Crítico y Emergencias"

Barcelona, España

07/10/2011 - 21/12/2012

Especialista de Universidad en Atención Integral en Cuidados Paliativos

Bilbao, España

Septiembre de 2011-Septiembre de 2012. Bilbao

Máster en Gestión Empresarial para la Industria Farmacéutica y Afines

Barcelona, España

Octubre 2011 - Junio 2013. Barcelona

Postgrado de Experto en Técnicas de Neuroimagen - Brain Dynamics

Campanillas, España

02/03/2012 - 31/01/2013

Cursos

Congresos

Jornadas

Premios/Becas

Reuniones

Simposios

Otras activ.

anuncia un evento

Best sellers

Novedades

Centro de suscripciones

Elsevier Farma

Información para...

RSS



ACTUALIDAD

OPINIÓN

MEDICINA

OCIO Y CULTURA

HEMEROTECA

- Noticias
- Para no perderse
- Agenda de eventos

PODCASTS 

- Actualidad Jano
- Ocio y Cultura

- Al día
- Observatorio
- Innovación
- Entorno biomédico
- Especialidad
- Últimas Noticias

- Editorial
- Voz de los expertos
- También Elsevier
- Cartas al editor

- Medicina
- Humanidades Médicas

- Grandes reportajes
- Rueda de escritores
- Para no perderse
- La columna
- La vuelta al mundo...

- JANO en PDF
- Archivo de noticias



ELSEVIER

JANO: [Equipo Editorial](#) [Quiénes somos](#) [Política de privacidad](#) [Publicidad](#)

Sitios Elsevier: [Elsevier.es](#) [Prepárate para el MIR](#) [StudentConsult.es](#) [ElsevierInstituciones](#)

JANO.es es un portal dirigido exclusivamente a los profesionales de la salud.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

ELSEVIER © 2012

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/sintomas/psicologicos/influyen/mas/variables/espirometricas/pacientes/fibrosis/quistica/_f-11+iditem-17863+idtabla-1