

ESTUDIO PRESENTADO EN EL 41 CONGRESO DE NEUMOSUR, QUE CÓRDOBA ACOGE HASTA HOY

La mitad de los pacientes con asma no están diagnosticados

► El neumólogo del Reina Sofía Luis M. Entrenas coordina esta investigación

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Casi la mitad de los pacientes de Andalucía y de Córdoba que padecen asma (en concreto, un 48%) no tienen diagnosticada su patología. Así se desprende de un estudio realizado por especialistas de Neumosur, la sociedad científica que aglutina a los neumólogos del sur de España, y que se ha presentado en el 41 congreso de este colectivo que se celebra desde el pasado jueves y hasta hoy en Córdoba, con la participación de unos 275 especialistas. El trabajo de investigación, elaborado entre los más de 400 centros de salud de la comunidad autónoma andaluza, pone de manifiesto asimismo que la asistencia de los facultativos se hace mayoritariamente a demanda del paciente y no pro-



MIGUEL ÁNGEL SALAS

►► Especialistas asistentes ayer al congreso de Neumosur.

grama (98,96% de las ocasiones). La labor de coordinación de este trabajo ha corrido a cargo del doctor Luis Manuel Entrenas, neumólogo del hospital Reina Sofía.

El 72,77% de los médicos de atención primaria que tratan a los pacientes son capaces de realizar el diagnóstico, aunque tan sólo el 54,6% lo hace siguiendo las guías de tratamiento.

El espirómetro, la herramienta

más eficaz para diagnosticar una patología respiratoria como el asma, está presente en el 88,34% de los centros estudiados. A ello se une que la espirometría la realizan, en el 84,46% de las veces, enfermeros, los cuales han recibido la formación pertinente en un 73,65% de las ocasiones. En lo que respecta al tratamiento, en el 60,67% de las ocasiones nadie realiza adiestramiento del paciente en el manejo de los

inhaladores. Cabe reseñar que tan sólo el 9,7% de las consultas de Primaria disponían de un programa educativo completo para ayudar al paciente a comprender y convivir con su patología. En el resto de casos se aplican apartados aislados de lo que debe ser una educación básica sobre asma, aunque en lo que menos se forma al paciente es a monitorizar sus síntomas (en torno al 21%) fin de saber variar el tratamiento en función de su gravedad.

CONCLUSIONES // Por tanto, como conclusiones del estudio se desprende que la asistencia se realiza a demanda del paciente, no se suelen seguir las guías de tratamiento, en la mayoría de los centros se dispone de espirómetro homologado y las exploraciones la realiza personal de enfermería adiestrado, no se determina el grado de control ni se reconocen sus elementos, concluyendo con el dato de que hay un infradiagnóstico del asma en la comunidad autónoma andaluza. ■